

Borttagande av livmoder

Om oss

GynStockholm som startade 1998 har specialiserat sig på borttagande av livmoder från slidan och utför flest sådana operationer i Sverige. Vi utför även operationer för andra sjukdomar inom gynekologin samt har allmän gynekologisk mottagning.

Kliniken ligger på S:t Görans sjukhus område. Det går lätt att komma hit med allmänna transportmedel eller bil.

Vi har förenklat de gynekologiska operationerna vilket i allmänhet också medför kort vårdtid och snabb återgång till de dagliga aktiviteterna. Vi tar fullt ansvar för patienterna och det är lätt att per telefon /mail komma i kontakt med den doktor som opererat om problem skulle uppstå. Du kan självklart styra när du vill bli opererad.

Du kommer att bli opererad av Med Dr Bo Anzén eller Folke Flam. Bägge har utfört 2.000–3.000 operationer av denna typ.

Om operationen

Syftet är att på det för dig bästa sättet ta bort livmodern. Av kallelsen ett par veckor innan ingreppet kommer att framgå hur du ska göra med eventuella mediciner och frukost den dagen du opereras.

Du kommer att få ta några blodprover innan operationen.

Du kommer till vår operationsavdelning samma dag som operationen sker. Målsättningen är kontinuitet och att du blir opererad av den doktor du träffat på mottagningen. Du kommer också att få träffa narkosläkare.

I allmänhet sker operationen från slidan och tar 25–40 minuter. Även om livmodern är kraftigt förstörd av muskelknutor kommer det att fungera med en vaginal operation. Du är sövd. Du får en kateter till urinblåsan som tas bort nästa morgon innan du går hem.

Om operationen sker med ett buksnitt (tar 30–45 minuter) kommer du ofta att vårdas ett dygn längre.

I bägge fallen har du värk den första tiden och du får recept elektroniskt på värktabletter samt sjukskrivning 4 veckor.

Du kan fysiskt göra vad du orkar hemma inklusive tunga lyft men i allmänhet tar det ändå ett par veckor att fysiskt och mentalt återhämta sig.

Övrigt

Livmodern skickas för mikroskopisk undersökning och när analysen kommer efter ett par veckor kontaktas du.

Det är vanligt med flytning de första veckorna. Du ska inte få feber.

Du kommer att erbjudas ett återbesök för utvärdering av operationsresultatet.

